

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2024年9月6日）

■第1版 第1刷（2024年9月15日発行）の修正・更新箇所


頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
目次					
9	目次中のダウンロード可能な図表一覧	ダウンロード可能な図表に、右の図表を追加しました(書籍特典ページからダウンロードできます)	p.12 図1「人は血管とともに老いる」の図 p.56 図4「脂肪酸の種類」の図		24/09/06
4章9 骨粗鬆症					
388	図1 骨代謝マーカーの適切な使い方	ビスホスホネート SERM エルデカルシトール	デノスマブ ビスホスホネート SERM エルデカルシトール	図中にデノスマブを追加 ※1参照	24/09/06
7章 予防接種とワクチン					
504	表3 患者さん説明用: 予防接種 間隔一覧	子宮頸がん(4価)の備考欄に右欄の内容を追加 子宮頸がん(4価)の下に、 子宮頸がん(9価)の行を追加 表の下に、注釈*A~*Cを追加	小6~高1の男性(*A) 中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジローマの予防	※2参照 本書の書籍購入特典のダウンロードデータも修正済みです	24/09/06

図表

※1

赤字: 追加箇所

▶図1 骨代謝マーカーの適切な使い方



▶表3 患者さん説明用：予防接種 間隔一覧



		年	月	日	様														
					●初回接種 (基礎免疫) ○追加接種														
種類	接種回数	間隔	接種量	1カ月後 2カ月後 3カ月後 4カ月後 5カ月後 6カ月後												備考			
				週0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26		
★不活性化ワクチン	インフルエンザ	13歳以上1回 13歳未満2回	0、2～4週後 皮下	3歳以上0.5 mL 3歳未満0.25 mL	●	○												毎年接種	
	肺炎球菌	23	1回 (ニューモバックスNP)	初回から5年以上後 筋肉・皮下	0.5 mL	●													○ 5年以上後 *1
		13*2	1回 (プレベナー13)	筋肉	0.5 mL	●													
		15	1回 (バクテリナックス)	筋肉	0.5 mL	●													
	A型肝炎	初回：2回 追加：1回	0、2～4週後 24週後 筋・皮下	0.5 mL	●	●												○ *1 10歳未満は皮下注射のみ	
	B型肝炎	3回	0、4、20～24週 筋・皮下	10歳以上0.5 mL 10歳未満0.25 mL	●	●													
	破傷風 (トキソイド)	初回：2回 追加：1回	0、3～8週後 初回後6カ月以降 筋・皮下	0.5 mL	●	●												○ (標準12～18カ月後)	
	狂犬病 (KMバイオロジクス社)	暴露前：3回 暴露後：6回	暴露前：0、4、6～12カ月後	全年齢1.0 mL 皮下	●	●												○ 約1年後	
	狂犬病 (グラクソ・スミスクライン社)	暴露前：3回 暴露後：4～6回	暴露前：0、1、3週後または0、1、4週後	全年齢1.0 mL (筋)	●	●													
	日本脳炎	(第1期) 初回：2回 追加：1回	初回：0、1～4週後 追加：初回終了後1年 皮下	6カ月～3歳未満0.25 mL 3歳以上0.5 mL	●	●												○ 約1年後 *3	
子宮頸がん (2価)	3回 (サーバリックス)	0、1、6カ月後 筋肉	0.5 mL	●	●														
子宮頸がん (4価)	3回 (ガーダシル®)	0、2、6カ月後 筋肉	0.5 mL	●	●												小6～高1の男性* A 中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジロームの予防		
子宮頸がん (9価)	1回目：14歳以下：2回* 2回目* 1回目：15歳以上：3回* 3回目*	0、6カ月後 0、2、6カ月後	0.5 mL	●	●														
ポリオ	4回	0、6週以後 皮下	全年齢0.5 mL	●	●	●	●										○ 12～18カ月後 昭50～52生は追加接種推奨 就学前に2回目の追加接種推奨		
★生ワクチン	麻疹 (M)	1回	皮下	全年齢0.5 mL	●														
	風疹 (R)	1回	皮下	全年齢0.5 mL	●														
	水痘	1回* 4	皮下	全年齢0.5 mL	●												* 4 1回目：定期接種 2回目：任意接種 (標準的間隔は6～12カ月後)		
	おたふく	1回* 5	皮下	全年齢0.5 mL	●												* 5 2回接種が望ましい (2回目は小学校入学の前年)		

*1 2024年4月から接種時に65歳で初回のみ公費対象。再接種は前回接種より5年以上あけること
 *2 13価は小児（月齢2カ月以上6歳未満）に定期接種される
 *3 1995年4月2日から2007年4月1日生まれで4回接種が終わっていない人は未接種分を20歳未満までに接種することが可能
 *A 補助の有無は自治体により異なります
 *B 1回目と2回目の接種は少なくとも5カ月以上あけます。5カ月未満の場合は3回目の接種が必要になります
 *C 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2カ月後と6カ月後にできない場合、2回目は1回目から1カ月以上、3回目は2回目から3カ月以上あけます
 ※★不活化ワクチン接種後は1週間（6日以上）たってから、★不活化ワクチン・★生ワクチンを接種
 ※★生ワクチン接種後は4週間（27日以上）たってから、★不活化ワクチン・★生ワクチンを接種